

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE SYV OG TREDIVTE BIND

TREDIE HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4<sup>me</sup> SÉRIE TOME 37 3<sup>me</sup> LIVRAISON




# HØSTENS UDFALD I DANMARK 1911

FORELØBIG REDEGØRELSE

CARACTÈRE DE LA RÉCOLTE EN DANEMARK 1911

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1911

---

Udgivet i November 1911.

---

Som sædvanlig har Bureauet gennem Amterne indhentet Oplysninger om Aarets Høstudbytte, saaledes som dette frembyder sig for et foreløbigt Skøn. I de to første Afsnit af nærværende Redegørelse gives, paa samme Maade som for de foregaaende Aar, en paa Grundlag af Maanedsoversigterne fra Meteorologisk Institut samt Beretninger i landøkonomiske Fagskrifter udarbejdet Fremstilling af Landbrugsaarets Vejrforhold og disses Indvirkning paa de forskellige Afgøder. Selve Resultaterne af Amternes Indberetninger findes gengivne i Tabellen Side 20 med de dertil knyttede Bemærkninger (Afsnit 3).

### 1. Klimatiske Forhold.

Efteraaret begyndte med en mild Oktober, idet Maanedens Middeltemperatur, ca.  $9^{\circ}$ , laa  $1^{\circ}$  eller lidt mere over Normalen<sup>1)</sup>, og kun enkelte Dage var Temperaturen under det normale. Nattefrost optraadte ret hyppigt paa spredte Dage. I Modsætning her-til laa Novembers Middeltemperatur  $3,0^{\circ}$  og  $2,0^{\circ}$ , henholdsvis paa Landbohøjskolen og i Tarm, under den normale; den lave Temperatur skyldtes imidlertid ikke nogen særlig udpræget Frostperiode, men var fordelt ret jævnt over hele Maanedens. I December var Temperaturen atter højere, idet den delvis laa over Novembers, og Maanedens Middelvarme overskred Normalen med noget over  $2^{\circ}$ , saaledes at 6. til 26. December betegnede en sammenhængende mild Periode med Temperaturer, der laa  $5-6^{\circ}$  over Normalen. Nattefrost optraadte kun i Maanedens første og

---

<sup>1)</sup> Samtlige Temperaturangivelser er i Grader Celsius.

sidste Dage. Aarrækken siden 1860 har kun 3 Gange frembudt en mildere December. De følgende Vintermaaneder udmærkede sig i samme Retning, idet Middelttemperaturen baade i Januar og Februar var  $1,7^{\circ}$  og  $2,0^{\circ}$  over Normalen, henholdsvis paa Landbohøjskolen og i Tarm, medens den paa de samme Stationer i Marts var  $1,5^{\circ}$  og  $1,1^{\circ}$  over det normale, og Maaneden sluttede med en Varmegrad op til  $5^{\circ}$  over den normale. — Vinterhalvaarets Frostperioder var i Overensstemmelse med Vinterens milde Forløb kortvarige og som Helhed af ringe Styrke, idet kun faa Stationer i Landets koldeste Egne noterede Minimumstemperaturer paa  $\div 10^{\circ}$  til  $\div 11^{\circ}$ . — Perioder med Snelæg var ligeledes kortvarige og af ringe Betydning; det stærkeste Snefald indtraf 6.—9. Januar. — Nedbøren i Vinterhalvaaret faldt en Del forskelligt. Paa Øerne, hvor den normale Nedbør er 253 mm i Københavns Amt, stigende mod Syd og Vest til 316 mm i Svendborg Amt, var Nedbøren tæt ved det normale, dog saaledes at den i de fleste Amter laa noget derunder. I Jylland gjorde det samme Forhold sig gældende for Randers, Aalborg og Hjørring Amter, hvor Nedbøren var tæt ved Normalen, medens den i samtlige øvrige jyske Amter var over Normalen; forholdsvis stærkest Nedbør fik Aarhus, Vejle og Ribe Amter med 70—100 mm mere end normalt. Nedbøren var særlig stor i November, men den var dog ogsaa i Halvaarets sidste to Maaneder overvejende over det normale.

I April var Middelttemperaturen ligesom i de foregaaende Maaneder over det normale, dog kun i ringe Grad, men Temperaturens Fordeling var meget uensartet, idet Dagene 3.—6. April gennemsnitlig var  $5,6^{\circ}$  koldere end normalt; 6. April var særlig kold med en Maksimumstemperatur paa  $\div 0,7^{\circ}$ . Temperaturen svingede hyppigt, dog saaledes at Perioden 15.—26. gennemgaaende var varmere end normalt. — Temperaturforholdene i Maj—August ses af omstaaende Tabel. Det fremgaar heraf, at Middeltallet for de fire Maaneder ligger  $1,3^{\circ}$  over Landets normale Varmegrad i disse Maaneder, men af de anførte Stationer er det de vestligste, der frembyder den største Afvigelse fra Normalen, Vestervig med  $1,9^{\circ}$  og Herning med  $2,3^{\circ}$ . Endvidere

Middelvarmen i °C. paa forskellige Stationer i Maj—August 1911  
og efter 40 Aars Maalinger (1861—1900).

	Maj		Juni		Juli		August		Maj—August	
	1911	Normalen	1911	Normalen	1911	Normalen	1911	Normalen	1911	Normalen
Vestervig . . .	12,6	9,4	14,2	13,3	16,1	15,0	17,5	14,9	15,1	13,2
Herning . . . .	13,6	9,8	14,8	14,0	16,9	15,2	18,0	14,8	15,8	13,5
Ryslinge . . . .	12,9	10,0	13,8	14,1	16,4	15,7	17,5	15,2	15,2	13,8
Landbohøjsk. .	13,3	10,6	15,1	15,2	17,1	16,7	18,3	16,0	16,0	14,6
Abed . . . . .	13,4	10,8	14,7	14,9	17,0	16,6	18,8	16,1	16,0	14,6
Hele Landet. .	12,7	10,2	14,3	14,5	16,5	16,0	17,9	15,6	15,4	14,1

bemærkes det, at disse Maaneders høje Middelvarme særlig skyldes Maj med 2,5° og August med 2,3° over Normalen, medens Juni Maanedes Temperatur laa 0,2° under Normalen.

Nedbøren i Sommerhalvaaret har som Helhed været lille. I April afveg Regnmængden ikke meget fra den normale, og der var kun ringe Forskel fra Amt til Amt. For Maj gælder noget nær det samme, dog saaledes at i Jylland faldt den største Regnmængde i Aarhus, Viborg, Aalborg, Ringkøbing og Thisted Amter med 33—39 Millimeter; paa Øerne fik Københavns Amt 51 mm, medens Nedbøren i Maribo Amt var 17 mm og paa Bornholm kun 6 mm. Nedbørmængden i Juni-August ses af omstaaende Tabel. Det fremgaar heraf, at Regnmængden for Landet som Helhed betragtet var 33 mm under Normalen, men Afvigelsen fra det normale var højst uens i Landets forskellige Egne. Holbæk Amt fik noget over Amtets normale Nedbør, medens Frederiksborg og Hjørring Amter fik omtrent Normalen; men herefter var Nedbørmængden kendelig mindre i den øvrige Del af Landet og særlig i Thisted, Ringkøbing og Viborg Amter, hvor Regnmængden var omkring 40 pCt. under det normale. I Juni var Nedbøren overalt i Landet meget rigelig, indtil det dobbelte af Normalen, medens der i Juli og August kun faldt lidt over halvt saa megen Regn som i et normalt Aar.

## Oversigt over Nedbøren i Millimeter i Juni, Juli og August.

Nedbøren i	1911				Juni—August tilsammen		
	Juni	Juli	August	Til- sam- men	1910	1909	1861—85
Københavns Amt. . . . .	75,6	43,2	41,6	160,4	185	154	185
Frederiksborg — . . . . .	79,0	58,1	45,7	182,8	184	162	190
Holbæk — . . . . .	85,8	32,5	56,0	174,3	192	141	168
Sorø — . . . . .	77,6	37,0	42,8	157,4	215	161	175
Præstø — . . . . .	63,7	32,6	33,7	130,0	244	168	181
Bornholms — . . . . .	43,0	48,4	31,0	122,4	229	156	161
Maribo — . . . . .	78,1	37,0	31,0	146,1	227	167	168
Svendborg — . . . . .	76,8	39,2	37,9	153,9	263	179	200
Odense — . . . . .	93,8	31,3	30,4	155,5	264	176	183
Vejle — . . . . .	104,6	31,5	29,8	165,9	281	163	204
Aarhus — . . . . .	85,8	30,8	27,8	144,4	261	192	200
Randers — . . . . .	80,5	27,5	21,3	129,3	253	166	187
Aalborg — . . . . .	74,7	47,4	41,1	163,2	279	187	184
Hjørring — . . . . .	80,0	52,8	42,8	175,6	262	171	179
Thisted — . . . . .	60,3	32,2	23,4	115,9	284	222	201
Viborg — . . . . .	54,4	29,3	34,4	118,1	275	186	189
Ringkøbing — . . . . .	63,5	34,2	30,1	127,8	283	219	203
Ribe — . . . . .	93,8	39,2	23,6	156,6	268	259	210
Gennemsn. f. hele Landet	78	37	35	150	244	179	183
Middelnedbør for hele Landet efter lagtagelserne 1861—85 . . .	47	66	70	183	—	—	—

I September holdt Temperaturen sig vedblivende høj, idet Varmegraden gennemsnitlig var ca. 1° og noget mere over det normale, og næsten alle Maanedens Dage var varmere end sædvanlig. Nedbøren var, ligesom i de to foregaaende Maaneder, ringe; de sydligste Øer fik kun  $\frac{1}{3}$  af den normale Nedbør, medens Jylland fik omkring Halvdelen af det normale. Nedbøren faldt tilmed ugunstigt for Rodfrugtafgrøderne, idet den væsentligst faldt i Maanedens sidste Tidøgn.

## 2. Landbrugsforholdene i Almindelighed.

Høsten 1910 faldt meget uens. Nogle Steder var der indhøstet inden 1. September, medens mange Landbrug i næsten

alle Egne først fik Høsten afsluttet en Maaned senere. Forholdene for Efteraarsarbejderne var derfor noget forskellige ved det ny Landbrugsaaars Begyndelse. Vintersædens Saaning var dog som Regel tilendebragt paa det sædvanlige Tidspunkt og under gode og tildels endog særdeles gode Betingelser, ligesom Sædens Spiring og senere Udvikling havde de bedste Vilkaar; i Beretningerne for Midten af November hedder det ogsaa, at Vintersædsmarkerne næsten overalt stod med en kraftig grøn Farve.

Det store Arbejde med Roehøsten foregik ogsaa under gode Forhold, uden at Arbejdet blev vanskeliggjort eller Roerne tog Skade paa Grund af indtrædende Frostperioder. Allerede 2. November lød Beretningerne paa, at det lakkede stærkt mod Roehøstens Afslutning. — Om selve Efteraarsarbejdet med Jordens Pløjning m. v. gælder det samme, at Arbejdet foregik under gode Forhold og blev godt fremmet. Kun fra de sværeste Jorder blev der en Tid klaget over, at Jorden var for tør og skorpet; men i sin store Helhed blev Markarbejdet ret tidlig afsluttet (inden Aarets Udgang); og selv hvor man ikke naaede saa vidt, kunde Arbejdet fortsættes i Vintermaanederne, der kun gav lidt Snelæg og kun kortvarige Frostperioder. Som det var at vente efter de gunstige Vejrforhold i Efteraaret og Vinteren, tegnede Vintersæds- og Kløverafgrøderne godt ved Foraarets Komme, ligesom alle Betingelser var til Stede for en tidlig Paabegyndelse af Foraarsarbejderne.

Foraarsarbejdet begynder i Almindelighed paa de sydlige Øer i Marts Maanedes Slutning, men her blev det hæmmet ved en ret stærk Nedbør, og efterat Saaningen paa sine Steder var paabegyndt, hindredes Arbejdet ogsaa ved indtrædende betydelig Nattefrost i den første Uge af April med en Dagtemperatur, der særlig 4.—6. April laa under Frysepunktet. De egentlige Foraarsarbejder maatte derfor fuldstændig indstilles og blev først genoptagne i Dagene lige forud for Paasken (midt i April). Paa de sydlige Øer var man i det væsentlige færdig med Saaningen inden Paasken; men i Landets øvrige Egne blev Saaningen først ret almindelig efter Helligdagene. Trods de gunstige Forudbetingelser trak Foraarssaaningens mange Steder i Langdrag, thi endnu i

Beretningerne af 10. Maj omtales det ustadige Vejr som uheldigt for Saaningens Tilendebringelse i de sildigere Egne. Men i samme Beretninger udtales ogsaa, at det sommerlige Vejr, der derpaa indtraadte, havde en forbausende Indvirkning paa hele Vegetationen. Om Hveden hed det saaledes, at den tidligst saaede næsten var for frodig, om Rugen, at den ikke havde langt igen inden Skridningen, og om Vaarsæden, at den tidligst saaede allerede dækkede Jorden, og at den senere saaede var ved at naa den samme Udvikling. Lignende gode Beretninger fremkom for 17. og 24. Maj, og heri fremhæves særlig de gunstige Vækstbetingelser for Græsafgrøderne, der selv fra Landets nordvestlige Egne omtales som saa vidt fremskredne, at der allerede da var «Slaagræs» paa Ager og Eng. Den 7. Juni lød Beretningerne langt mindre gunstige, idet den stærke Solvarme havde sat Spor først og fremmest paa Græsmarkerne, men ogsaa paa Vaarsæden, og særlig da paa de lette Jorder; men 21. og 28. Juni, efter at der var kommen rigelig Nedbør i alle Egne, var Beretningerne igen fortrøstningsfulde med Hensyn til Udsigterne for Kornhøsten. De senere Beretninger afviger ikke meget herfra, og 19. Juli fremhæves navnlig Hveden og Rugen, men ogsaa Bygget som særlig tilfredsstillende, hvorimod det om Havren hed, at den var kort i Straaet og ofte noget tynd.

Beretningerne af 26. Juli meddelte, at Høsten var begyndt; i større Omfang kom Maskinerne dog ikke i Gang før ind i August; men Travlheden blev da ogsaa meget stor i alle Landets Egne, idet den stærke Solvarme i første Halvdel af August Maaned fremskyndede Høsten. Sæden stod godt op, saa at Maskinerne havde gode Betingelser for Arbejdets Udførelse og allerede 16. August omtales, at mange mindre Gaarde var helt færdige med Høsten. Selv i Vendsyssel var det samme Tilfældet 8 Dage senere, og i sin store Almindelighed var Høsten under ualmindelig gode Betingelser tilendebragt ved Udgangen af August.

Af Aarets Kornafgrøder har Vintersæden haft de bedste Betingelser; Udsæden faldt rettidigt, Efteraaret var mildt og Vinteren ligesaa; der indtraf ikke i Foraarstiden Modgangsperioder, som den kraftige Udvikling ikke kunde modstaa. Sommerens



stærke Varme var under de givne Forhold ligeledes særdeles heldig. Allerede 31. Maj var Rugen ved at blomstre, og 21. Juni var Hveden gennemskreden. — Vaarsædens Saaning foregik ikke overalt under de bedste Forhold og i Almindelighed heller ikke saa tidligt, som det under Hensyn til den tidlig indtraadte og stærke Solvarme i Maj og senere i Juli og August kunde have været ønskeligt. Efterat Vaarsæden havde staaet i Stampe en Tid, blev Udviklingen baaret hurtigt frem af den første Varme i Maj; men navnlig paa de lettere Jorder havde Planterne ondt ved at modstaa det vedvarende tørre og varme Vejr. Juni Maanedes køligere og regnfuldere Vejrlig bødede ret hurtigt herpaa, saa at de tidligste Bygsorter var helt gennemskredne i Slutningen af Juni. Havrens Udvikling lod dog i Almindelighed noget tilbage at ønske; den havde ikke busket sig tilstrækkeligt i dens første Væksttid, fordi den blev fremdreven for tidligt i Vækstperioden, og senere blev Udviklingen standset ved den fremskyndede Modning, saa at Straaet blev noget kort. Den tidlige og noget hurtige Modning paavirkede i nogen Grad for al Vaarsædens Vedkommende Udviklingen af Kærnen, saa at denne blev noget mindre fyldig.

Rodfrugterne blev ikke lagt særlig tidligt, men dog ret tilfredsstillende, saa at Udviklingen af Sukker- og Runkelroer ikke stod tilbage; 17.—24. Maj lød Beretningerne paa, at disse Roer sorter var komne godt frem uden Spring i Rækkerne, og 14. Juni hed det, at Sukkerroerne var udtyndede og Udsigterne gode. Navnlig om Kaalroerne hed det Gang paa Gang og endnu i Midten af Juni, at Jordlopperne afbed de unge Planter, saa at der atter og atter maatte saas paany. Efter Juni Maanedes køligere og regnfulde Vejr lykkedes Fremvæksten vel, men den stærke Solvarme i Juli—August, kun ledsaget af ringe Nedbør, gav ikke gunstige Betingelser for den fortsatte Udvikling.

Kløver- og Græsmarkernes Udvikling var fra Efteraaret langt bedre end sædvanlig, og Vinteren gik Planterne godt igennem, uden at Kløveren led nævneværdigt ved Sygdomsangreb. Ved Foraarets Komme var Plantebestanden derfor tilfredsstillende, saa at man ventede et stort Udbytte; men allerede 7. Juni blev

der klaget almindeligt over, at Væksten var standset under Maj Maanedes stærke Solvarme, idet der ikke fremkom friske Skud, hvor Græsset var affidt. De staaende Afgrøder var samtidig for grove til Afgræsning, saa at meget Kvæg maatte indbindes. Efter Juni Maanedes gunstigere Vejrforhold udbandtes Kvæget paany først i Juli, men den senere indtrædende stærke Solvarme i Juli—August standsede atter Væksten, saa at alle lettere Jorder var afsvedne. Høhøsten paa Agermarken blev vel i mange Landbrug i alle Egne fremskyndet saaledes, at Høet blev stakket noget ind i Juni, og hvor det var Tilfældet, kom Høet fortrinligt i Hus; men i sin større Almindelighed foregik Høhøsten senere, og den faldt fortrinsvis under Juni Maanedes ustadige Vejrforhold, saa at det endnu i Midten af Juli først lykkedes at bjerge det sidste Kløverhø i Hus, og saadant sent bjerget Hø var naturligvis af mindre værdifuld Beskaffenhed.

I Henhold til det foregaaende kan Høstaaret 1911 karakteriseres saaledes:

En varm Oktober efterfulgtes af en kølig November, men iøvrigt forløb Vinteren særdeles mildt, delvis med ringe Nedbør og overalt med ringe Snelæg. Vintersæden blev saaet i normal Tid og stod Vinteren godt igennem. Den første Foraarsvarme kom ret tidligt, men afbrødes snart af uroligt og koldt Vejr. Foraarssæden blev saaet til ret forskellig Tid, men den kom tidligt i frodig Vækst. Maj var varm og solrig, Juni kølig og regnfuld, Juli og August atter varme og tørre. De langvarige Varme- og Tørkeperioder drev navnlig Vaarsæden for stærkt frem og hindrede i nogen Grad Udviklingen af saavel Kærne som Straa. Kornhøsten faldt tidligt, den blev ualmindelig hurtigt tilendebragt, og Sæden kom i Hus i fortrinlig Stand. Rodfrugterne led delvis under Insektangreb, og Sommerens stærke Solvarme og ringe Nedbør hindrede i ikke ringe Grad en frodig Udvikling af disse Planter. — Paa Græsmarkerne blev Væksten tidligt standset og Høhøsten faldt ofte uheldigt, saa at Forventningerne om et rigt Udbytte af Hø og Græsning blev skuffede, for Høets Vedkommende særlig paa Øerne, for Græsningens overalt.

### 3. Amternes Høstberetninger.

Om Høstaaret i Almindelighed og om de enkelte Afgrøder har Bureauet fra Amtene modtaget en Række Udtalelser, hvoraf man skal anføre følgende:

Københavns Amt: For Kornsorternes Vedkommende kan indeværende Aars Høst for Københavns Amt betegnes som Middelhøst, hvad Kvantiteten angaar, medens Kvaliteten her som næsten overalt er særdeles fin og den hollandske Vægt gennemsnitlig høj. Vintersæden er den bedste; navnlig har Hveden givet et jævnt godt Udbytte, Vaarsæden og da især Bygget er derimod ringere. Det synes som om den tidligst saaede Vaarsæd, hvor Jorden var velbehandlet, paa Grund af det gunstige Foraar har givet et betydelig større Foldudbytte end den Sæd, der blev saaet senere, idet den tidlige Sæd som Følge af det fugtige Vejr fra Midten af Juni til ind i Juli fik en langt heldigere Skridning, end den senere saaede, der endnu ikke havde fuldendt Skridningen, da Varmen og Tørken indtraadte. Herfra skriver sig vist nok for en stor Del de meget afvigende Meddelelser om Foldudbyttet. — Den tørre Sommer har jo i det hele for alle Kornsorters Vedkommende medført, at Kærnen er bleven temmelig lille og Foldudbyttet derfor væsentlig forringet; megen Sæd blev desuden for hurtigt modent, ja endog overmodent, hvad der foranledigede et stort Spild af Korn paa Markerne. — Plantesygdomme og Larveangreb forekom kun sporadisk; enkelte Steder har der saaledes været Brand og Stribesyge i Bygget, hvor Afsvampning har været forsømt. — En stor Fordel har det tørre Vejr bragt, nemlig en overordentlig hurtig og meget billig Høst; hele Høsten, der her i Amtet begyndte i Dagene fra 25.—30. Juli, var paa det nærmeste endt de fleste Steder omkring 20. August og ikke faa Steder tidligere. Høhøsten blev jævnt god, men noget knap paa Grund af Tørken. I flere Egne led Høet ogsaa nogen Skade ved Regn i Høsttiden. Sommergræsningen har saa godt som alle Vegne efter Høslæt været meget ringe, og Kreaturerne har derfor tidligt maattet tages paa Stald. Rodfrugterne har lidt mest under den vedholdende Tørke, navnlig Kaalroer og Turnips, Runkelroer i mindre Grad, og Udbyttet vil sikkert blive betydeligt under Middel. Fra næsten alle Egne af Amtet meldes om Angreb af Bladlus og Orme paa Kaalroer og Turnips, hvorved disse blev afbladede og hæmmede i Væksten. Har Høsten saaledes end i flere Henseender ikke været saa god som ønskelig, bøder dog den gennemgaaende fortrinlige Kvalitet i Forbindelse med de forholdsvis gode Priser i væsentlig Grad paa Manglerne.

Frederiksborg Amt: Fra Landboforeninger i Amtet indberettes, at Kornhøsten som Helhed har givet over Middeludbytte, og at der er høstet usædvanlig godt paa Grund af det stadige Tørrevejr. Kvalitetsvægten er høj, bl. a. som Følge af de ganske fortrinlige Vejrforhold under Høsten. Rettidigt lagte Kartoffler har givet en forfrinlig Afgrøde, medens Roerne, dels paa Grund af Larveangreb o. a. og dels paa Grund af Tørken i August og September kun vil give et tarveligt Udbytte. Græsningen var ret god til at begynde med, men derefter paa Grund af Tørken maadelig. Af andre Beretninger fremgaar det, at Kornafgrøderne som Helhed ikke har lidt Skade af Plantesygdomme o. a.; thi selv om Bygmarker efter Roer nogle Steder blev haardt angrebne af Larver, rettede de sig senere og gav et godt Udbytte; kun en enkelt Indberetning nævner, at Angreb af Fritfluen paa Gradet Byg var stærkt tabbringende. Derimod har Roemarkerne været hærgede i ualmindelig Grad af Jordlopper og den sorte Bedelus, der endog en Overgang truede med helt at ville ødelægge Roerne. Tab ved Hagelbyger baade paa Rugafgrøden og Roer omtales fra flere Sider.

Holbæk Amt: Sommerens stærke Solvarme og Blæst og den ringe Nedbør er Grunden til, at Rodfrugter og Sommergræsning er daarligere i Aar end i Almindelighed, og de samme Forhold er Skyld i, at Kornet modnedes vel hurtigt, saa at Kærnerne er mindre fyldige og mere tykskallede end ønskeligt. Begunstiget af et ualmindelig heldigt Vejr er Høstarbejdet foregaaet meget hurtigt, men da man vanskeligt har kunnet naa at faa Kornet indbjerget, før det var overmodent, er Spildet paa Marken noget større end sædvanligt. Kaalroer og Turnips har en Del Steder været angrebne af Larver, og Havremarkerne har sporadisk været hjemsogte af Havreaal. — Holbæk Amts økonomiske Selskab bemærker om Høhøsten, at Kvaliteten faldt højst forskelligt ud, eftersom Høet blev bjerget før eller efter Regnperioden i Juni, og endvidere bemærkes om Runkelroerne, at disses Kvalitet vanskelig kan bedømmes endnu, fordi de flere Steder har vist sig angrebne af Hjerteforraadelse, men i hvor stort Omfang kan man ikke for Tiden have nogen bestemt Mening om.

Sorø Amt: Amtets Landboforeninger indberetter, at det tidlige og gode Foraars, hvor Jorden var meget bekvem at behandle, bidrog meget til, at Sæden spirede hurtigt, hvor Saaningen var foretaget rettidigt, og med den rigelige Nedbør, der faldt først paa Sommeren, var Sæden kommen i saa kraftig Vækst, at den kunde modstaa den lange Tørkeperiode og give en god Middelhøst for Vaarsædens Vedkommende. Høsten var meget let, fordi Sæden stod godt

op og Vejret var stadigt, men Sædspildet paa Marken var ikke ringe paa Grund af Sædens store Tørhed. Dog bemærkes ogsaa, at Kærneudviklingen ofte blev noget ringe som Følge af for hastig Modning i den stærke Varme. For Roerne blev Udbyttet derimod ringe, og Græsmarkerne gav hen paa Sommeren alt for lille Udbytte. Om Plantesygdomme m. v. bemærkes, at navnlig Bladlus har gjort en Del Fortræd paa Frøafgrøder af Runkelroer og ogsaa paa Foderroer; ligeledes har Fritfluen hærget en Del Havremarker. Endvidere har Jordlopper hærget de korsblomstrede Roesorter meget og hyppig foranlediget Omsaaning af Turnips og Kaalroer. Svampesygdomme har derimod ikke været meget fremtrædende som Følge af den stærke Tørke, der hæmmer Udviklingen af mange Plantesygdomme.

Præste Amt: Efter de modtagne Beretninger har Sædhøsten været tilfredsstillende. Hvad Kvantiteten angaar har Hvedeudbyttet været meget godt og for de andre Kornsorters Vedkommende noget over Middelhøst, medens Kvaliteten for saa vidt angaar Vintersæden har nærmet sig Karakteren „ug“ og for Byg og Havre gennemsnitlig er naaet lidt over „mg“. Roendbyttet ventes at blive betydeligt under Middelhøst, men Kvaliteten anslaaes til Middelhøst og derover, særlig for Sukkerroer og Runkelroer. Agerhø og Enghø har givet Middelhøst i Kvantitet, og Kvaliteten har været nærmere „mg“, medens Sommergræsningen har været ringe. — Karakteristisk for Aaret var den stærke Varme og Tørke i Sommeren og det fortræffelige Høstvejr. Da Virkningerne af Tørken har gjort sig stærkere gældende paa lette Jorder end paa de sværere, vil Forskellen mellem Bedømmelserne for de enkelte Ejendomme vistnok være større end sædvanlig. Ogsaa synes iaar Tidspunktet for Saaningen af Vaarsæden at have spillet en ikke ringe Rolle for Udbyttets Størrelse, idet Tørken ikke i samme Grad har skadet den tidligt saaede Vaarsæd som den senere saaede. Fra mange Sider fremhæves det, at den stærke Varme har modnet Sæden for hurtigt, saa at den ikke opnaaede saa høj Vægt, som man havde haabet paa. At Udbyttet af Rodfrugter ikke er blevet større og Sommergræsningen daarlig, maa ligeledes væsentlig tilskrives Tørken. Derimod synes Plantesygdomme kun i ringe Grad at have gjort sig gældende. Dog nævner Tureby, Køge og Omegns Landboforening Forekomsten af Stribesyge i Byg, hvor Afsvampning af Udsæden var forømt, og Klage over Forekomsten af samme Sygdom og Rust paa Bygmarkerne fremføres fra en Landmand i Stevns. Nogle flere klager over Insektangreb, saaledes over Smeldelarver i Amtets sydlige Del, og spredte Klager foreligger over Bladlus

og Jordløpper paa Roer, over Larveangreb paa Byg en Tid efter dets Saaning, over Fritfluer paa Havre, over Kløveraal, Havreaal og Stængellarver paa sent saaet Havre og Blandsød; men i det hele taget tør det formentlig efter det foreliggende Materiale antages, at man iaar her i Amtet ikke har haft Grund til særlig stærk Klage over Insektskade.

Bornholms Amt: Vintersæden, navnlig Rugen, led en Del under Vinterens fugtige Vejrlig, ligesom den ogsaa skadedes ved langvarig Nattefrost i Foraarstiden. Dette sidste skadede ogsaa i betydelig Grad Vaarsæden hen i Maj, ligesom disse Afgroeder led en Del paa Grund af Angreb af Smeldelarver. Under den langvarige tørre Periode i Sommeren klarede Vintersæden sig ubetinget bedst, medens Vaarsæden blev kort i Straaet og folder mindre stærkt; men Straa og Kærne blev udmærket. Runkelroerne spirede ofte daarligt, hvorfor der blev ómsaaet med Turnips, som igen maatte omsaas paa Grund af Angreb af Jordløpper; saadanne Afgroeder fylder derfor ikke meget; tilmed har Kaalroerne været meget angrebne af Kaalorm, der ofte helt har afribbet Bladene. Paa Agermarker blev Høudbyttet kun ringe paa Grund af Tørken, hvorimod kolde Enge gav et godt Udbytte. Om Græsningen bemærkes, at det tarvelige Udbytte blev opvejet en Del ved Græssets store Næringsværdi.

Maribo Amt: Indeværende Aars Høst maa i det væsentlige betegnes som værende over et Middelaars, idet Sommerens varme og tørre Vejrlig tilsyneladende har begrænset Plantesygdomme og Larveangreb, saaledes at alene Roerne kan siges at have været særlig hjemsøgte af Lus og Knoporm. Derhos har det stadige tørre Vejr i Høsten foranlediget, at Høstarbejdet blev tilendebragt usædvanlig let og hurtigt. Paa den anden Side har Tørken imidlertid bevirket, at Kornet, navnlig Bygget, modnedes for brat, hvorved Udbyttet maa antages at være forringet med omkring et Par Fold; Kærnen opnaaede ikke den fyldige Udvikling, som den tegnede til at ville naa. Endvidere har Tørken været skæbnesvanger for Eftersommerens Græsning, ved fra August Maanedes Begyndelse at bringe al Græsvegetation til Standsning, hvorhos den har hidført en betydelig Formindskelse af Rodfrugtafgroedernes Mængdeudbytte, hvilket dog noget opvejes ved det store Sukkerindhold i Sukkerroer og det store Tørstofindhold i Foderroer, medens Kartoflerne, og da navnlig de tidlige modne Sorter, synes at give omtrent normalt Mængdeudbytte.

Svendborg Amt: Ifølge de indgaaede Beretninger ligger Amtets Høst for Vintersædens Vedkommende noget over Middelhøst, hvad Mængdeudbyttet angaar, medens Vaarsæden har givet Middel-

høst. Aarsagen til at Udbyttet ikke ligger højere, angives at være den langvarige Tørke, der hæmmede Kærneudviklingen, men som tillige bevirkede, at Høsten foregik usædvanlig hurtigt og under saa gunstige Forhold, at Kvaliteten for alle 4 Kornsorters Vedkommende maa betegnes som sjelden god. Den tørre Sommer har haft en uheldig Indflydelse paa Høsten af de fleste Rodfrugter, for hvis Vedkommende — Kartoffler dog undtagne — Høsten gennemgaaende er under Middelhøst, og det samme gælder Sommergræsningen. Der klages fra mange Sider over, at Angreb af Bladlus i høj Grad har skadet Høsten af Runkelroer og særlig Avlen af Runkelroefrø.

Odense Amt: Den i sin Helhed meget tørre og varme Sommer angives fra næsten alle Steder at have haft en uheldig Indflydelse paa Mængdeudbyttet af Kornsorterne, idet den bevirkede en for hurtig og for tidlig Modning, der dog ikke har skadet Kærnenes Godhed. Af samme Grund klages der næsten alle Steder over en betydelig Foringelse af Rodfrugtavlens Udbytte, ligesom ogsaa Mængdeudbyttet af Høavlen formindskedes, navnlig under Indflydelse af den tørre og varme Forsommer. Sommergræsningen var i Begyndelsen rigelig og god, men senere paa Sommeren ualmindelig daarlig. Plantesygdomme og Larveangreb var ikke særlig ondartede i afvigte Sommer: Fra et enkelt Sted klages dog over nogen Rust i Hveden og Stengelbrand i Rugen, og fra et Par andre Steder over Fritfluier i Bygget, ligesom der fra flere Steder ankes over, at Havren udtyndedes i temmelig betydelig Grad paa Grund af Angreb af Havreaal. Om Roerne hedder det fra mange Steder, at de en lang Tid hæmmedes i deres Vækst og Udvikling ved stærke Angreb af Bladlus, der dog forsvandt temmelig hurtigt igen, saaledes at Rodfrugtavlens forholdvis ringe Udbytte nærmest maa siges at skyldes Sommerens langvarige Tørke. Vejrforholdene har i Aar været usædvanlig gunstige for en hurtig og god Indhøstning baade af Hø og Sædafgrøderne.

Vejle Amt: Koldings-Egnens Landboforening udtaler, at den ualmindelig varme og tørre Sommer har bevirket, at Kornafgrøderne er af udmærket Kvalitet og blev bjerget i fortrinlig Tilstand; men Tørken har tillige bevirket, at Afgroderne, særlig paa de lettere Jorder, er noget mindre i Kvantitet, ligesom Roerne og Sommergræsningen af samme Aarsag var ret tarvelig. Amtets vestligste Landboforening udtaler, at Sommerens Tørke har bevirket, at Vaarsædens Modning er foregaaet vel hurtigt, saa at Kærnen maaske ikke er saa fuldkommen som ønskeligt; af samme Grund er saa godt som alle Rodfrugtafgrøder paa denne Egn tarvelige og vil næppe give mere

end halvt saa meget som sædvanlig. — Plantesygdomme antages som Helhed ikke at have forvoldt større Tab, dog klages der i Lighed med tidligere Aar ret stærkt over Angreb af Kaalbroksvampen.

Aarhus Amt: Hovedkornsorterne har i kvantitativ og særlig i kvalitativ Henseende givet langt over Middelhøst; Bælgsædhøsten har i kvantitativ Henseende været lidt under og kvantitativt over Middelhøst, og det samme gælder Kartoflerne. Rodfrugternes Mængdeudbytte er ringe, og Græsningen har i Sommerens sidste Halvdel været meget daarlig; derimod har Høhøsten saavel paa Ager som Eng givet over Middeludbytte. Vil man herefter samle Høstens Hovedkarakter, maa det siges, at Kornhøsten 1911 i Aarhus Amt er langt over Middelhøst, medens Høsten af Rodfrugter er omtrent ligesaa meget derunder paa Grund af den lange Tørkeperiode fra Begyndelsen af Juli til Slutningen af September. Høsten er hjerget i udmærket Stand. Plantesygdomme og Insektangreb har ikke forvoldt større Skade, idet der kun i enkelte Indberetninger klages over Angreb af Smeldelarver paa Bygmarken samt af Kaalbroksvampen paa Kaalroerne.

Randers Amt: Kornhøsten gav et stort Udbytte, fordi der blev saaet under særdeles gode Forhold med paafølgende Regn, og senere kom der passende Nedbør, da Kornet skulde skride igennem; men herefter kom der ingen Nedbør før efter Høst. Den langvarige Tørke satte derfor Forventningerne om en udmærket Høst betydeligt ned, og Kærneudbyttet blev da ogsaa mindre, end det saa ud til. Det er dog i særlig Grad gaaet ud over Roemarkerne og Græsningen, idet Tørken trak ud til sidst i September. Græsningen har været meget tarvelig, ja mange Steder slet, hvorfor der ofte har fundet meget tidlig Indbinding Sted. Om Plantesygdomme indberettes, at Kaalroer og Turnipsmarker har været angrebne først af Jordlopper og senere af Larver og af Kaalbroksvampen; men iøvrigt er Sommeren forløben heldig i den Henseende.

Aalborg Amt: I flere af de indsendte Beretninger udtales, at Juni Maanedes rigelige Nedbør med paafølgende Varme fremkaldte udmærket Vækst for Vaarkornet og Græsset samt sikrede Foraarskornets gode Udvikling. Den fortsatte vedholdende Tørke i Juli og tildels i August bortsved for en Tid Græsarealerne og gav Roerne et Knæk, som de ikke forvandt. Dog bemærkes det om Runkelroer, der var tidligt saaede, at de fik en nogenlunde normal Udvikling; hvad Kvantiteten mangler vil rimeligvis indvindes ved foreget Tørstofindhold. Med Hensyn til Plantesygdomme omtales fra flere Sider, at Roemarkerne har lidt haardt under Angreb af Larver og Svampe,



saa at Bladene har været afribbede op til Stængelen, ligesom Kaalbroksvampen har været ualmindelig stærkt udbredt.

Hjørring Amt: Høsten har for Kornets Vedkommende været meget god og for Rugen endda ualmindelig god. Grunden hertil har været den fortrinlige Sommer. Saaningen af Vaarkornet begyndte tidligt, Jorden var bekvem, og tilstrækkelig Væde i Forbindelse med nogle Dages Varme i Maj bragte hurtigt Spirerne frem. Juni var ganske vist kold og bragte endda ikke saa lidt Nattefrost, men Kornet var da saa vidt fremme, at det ikke led synderligt under Kulden, og det blev i det væsentlige forskaanet for Larveangreb; kun Fritfluen er optraadt ganske faa Steder. Juni gav for største Delen af Amtet stærk Nedbør, og dette i Forbindelse med de meget varme Dage, som indtraf i Juli, var medvirkende til, at Kornafgroederne blev saa gode, som de sjældent ses i Vendsyssel. Enkelte Tordenbyger bidrog ogsaa til stadig at skaffe Kornet den fornødne Væde. Høsten indtraf allerede i Slutningen af Juli. Næsten alt Korn var samtidig modent, saa at det blot gjaldt om at skaffe den fornødne Arbejdskraft for at faa Arbejdet fra Haanden. Høstemaskiner kunde imidlertid anvendes i stort Omfang, og man havde derfor selv paa de større Gaarde i det væsentlige indhøstet i Løbet af en Maaned. Under Høsten faldt der næsten ingen Regn, saa at Kornet blev bragt i Hus i overordentlig god Stand. Paa de Steder, hvor der er tærsket, har Sæden da ogsaa givet en ualmindelig smuk Kærne. For Rodfrugternes Vedkommende stiller Aaret sig ikke saa godt. Særlig Turnips lader en Del tilbage at ønske. De blev saaede noget senere end Kornet og havde derfor ikke den tilstrækkelige Modstandskraft imod Juni Maanedes kolde Vejr. Mange Marker maatte saas om, og Juli og August bragte ikke tilstrækkelig Væde. Udbyttet bliver gennemgaaende kun temmelig godt. I Roemarkerne har Kaalbroksvampen atter i Aar optraadt ondartet og paa sine Steder ødelagt hele Marker af Kaalroer og Turnips. Ager- og Enghø har givet Middelhøst, hvorimod Græsningen til Kreaturerne har været ringe, særlig i Eftersommeren; der kom ikke tilstrækkelig Regn efter Slæt, og den stærke Varme sved mange Steder Spirerne helt bort.

Thisted Amt: Amtets Landboforeninger indberetter, at Vintersæd og Græsmarker overvintrede godt, og hvor Sæden var lagt rettidigt, blev Udbyttet godt baade i Kvantitet og Kvalitet, hvorimod den senere saaede Sæd ikke fik Tid til at udvikle sig normalt; dette gælder navnlig det seksradede Byg. Under Kornhøsten var Vejret ualmindelig gunstigt, hvorfor Sædens Kvalitet er i sjælden Grad fortrinlig og Vægten høj. Halmudbyttet er stort. Høhøsten

har givet et godt Udbytte, men Kvaliteten af Agerhø blev mange Steder forringet en Del paa Grund af regnfuldt Høstvejr. De Afgrøder, der har lidt mest under Sommerens Tørke, er Græs og Roer; de vil begge give en Del under Middelhøst. Med Hensyn til Rodfrugterne hedder det i andre Indberetninger, at den megen Varme og Tørke i Sommeren har bevirket, at de nye Kartoffelknolde mange Steder har spiret; Runkelroerne har bedst kunnet modstaa Sommerens Varme, medens de andre Sorter er tarvelige. Om Aarets store Halmudbytte bemærkes, at Kvaliteten vel er fortrinlig, men at Foderet næppe bliver drøjt, da Straaet er meget sprødt, hvorfor det bliver ualmindelig stærkt sønderdelt under Tærskningen.

Viborg Amt: Rugen fylder godt i Straaet, men Sommerterken har bevirket, at Kærnen er lille; dette gælder i endnu højere Grad Vaarkornet og navnlig den sent saaede Havre; dog er Kvalitetsvægten for alle Kornsorter bedre end i tidligere Aar. Sommergræsningen var til at begynde med god, hvilket bevirkede, at større Arealer end almindeligt overgik til Høslæt, og da Vejrliget her begunstigede denne Høst, er Udbyttet af Agerhø rigeligt, baade hvad Mængde og Godhed angaar. Engene kom sent i Grøde, og da man paa Grund af, at Kornhøsten trængte paa, ikke kunde opsætte Høhøsten, blev Mængdeudbyttet af Enghø noget mindre end forventet. Græsningen var fortrinlig i Forsommeren, men Græssets Vækst blev tidligt standset af den vedholdende Tørke. — Af Plantesygdomme og Larveangreb omtales Fritfluen særlig paa sent saaet Havre, Stængelbrand i Rugen og Stribesyge i Bygget, og endvidere Kaalbroksvampen, Knoporme og Kaalormes Angreb paa Roerne; særlig har Kaalormenes Angreb paa Kaalroerne flere Steder været ikke ubetydelige. Disse Larveangreb i Forbindelse med den vedholdende Tørke har bevirket, at der fra alle Sider i Amtet noteres ringe Udbytte af Rodfrugterne; navnlig gælder dette Kaalroer og Turnips. Tørken har derhos reduceret Høstudbyttet med Hensyn til Foderstof, idet dens Ødelæggelse af Sommergræsningen har bevirket, at Kreaturerne allerede fra Midten af August for en Del har maattet staldfodres, og som Følge deraf vil en ikke ubetydelig Del Foder være opbrugt før den normale Indbindingstid. Vejrforholdene har været fortrinlige for Høstarbejdet; der har været ringe Spild af Korn, og Høsten er tilendebragt i ganske ualmindelig kort Tid.

Ringkøbing Amt: Bølling-Nørre Herreds Landboforening (centralt beliggende i Amtet) indberetter: Sommeren har været karakteristisk ved Varme og Tørke, og medens Kornsorterne naaede en nogenlunde god Udvikling før Tørken her gjorde sig stærkt gældende,

led navnlig Kaalroer og Turnips stærkt af Tørke og blev lidet modstandsdygtige lige overfor de sædvanlige Fjender, Svamp og Larver. Kartoffler led ligeledes betydeligt, og Udbyttet af Kaalroer og Turnips vil næppe naa Halvdelen af det normale. Høsten faldt i sidste Uge af Juli og første Halvdel af August uden Regn. Indhøstningen blev derfor meget let og godt tilendebragt. Græsmarkerne var fra Foraaret gode, og der avledes over Middelhøst af Kløverhø; dette tog dog nogen Skade paa Grund af Regnbyger, der uden at bløde syndeligt paa Jorden, dog vanskeliggjorde Hø høsten. Men efter Høslæt standsedes Vegetationen paa Grund af Tørken, og der blev ingen Græs senere paa Sommeren. Engene led i Forsommeren Skade ved Nattefrost, og Høudbyttet blev derfor ikke normalt; men Eftergræsningen blev god. Plantesygdomme har hos Kornsorterne ikke været særlig fremtrædende; men Kaalroer og Turnips har været stærkt angrebne af Kaalbrok-svamp og Kartoffler af Skimmelsvamp. Af Larveangreb er der paa Kornet iagttaget lidt Angreb af Fritflue- og Stankelbenlarver, medens Kaalroer og Turnips har været stærkt angrebne af Kaalmøl og i mindre Grad af Kaalorme.

Ribe Amt: Amtets Konsulent beretter, at det jævnlige Regn-vejr, vi havde i Juni Maaned, har gjort, at denne Egn har en stor Avl af Hø og Korn, og i den tørre Tid, der fulgte i Juli og August, blev denne Del af Avlen hurtigt og udmærket godt bjerget. Udbyttet af Roer og Kartoffler bliver derimod paa Grund af den langvarige Tørke mindre godt. — Fra anden Side bemærkes om Kornhøsten, at tidligt saaet Byg var udmærket baade hvad Mængde og Godhed angaar, medens det sildigt saaede var en Del ringere paa Grund af for hastig Modning. — Om Roerne bemærkes i en Indberetning, at de, trods Tørken, paa bedre Jorder er ret gode, naar undtages Kaalroer, der saa godt som overalt er mislykkede, og paa let Jord er hele Roeavlens mislykket. En anden Indberetning betegner Roehøsten som den ringeste siden man begyndte at dyrke Roer. Om Græsningen bemærkes, at medens den i Forsommeren var særdeles god, maatte Kreaturerne i August og September væsentlig fodres med den indavlede Sæd. Om Larveangreb udtales fra Ribe Herred, at Kartofflerne mange Steder er gennemborede af Oldenborrelarver.

---

Omstaaende tabellariske Oversigt viser, hvorledes Høsten er bleven bedømt for hver enkelt Afgrøde i de enkelte Amter, saavel hvad Kvantitet som hvad Kvalitet angaar. Karakteren «g» (godt)

Amterne	Hvede			Rug			Byg			Havre		
	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt	Kvantitet	Kvalitet	Holl. Vægt
Københavns . .	mg ÷	ug ÷	134	g +	mg +	127	g	mg +	118	mg ÷	mg	90
Frederiksborg .	mg	ug ÷	133	g +	mg +	126	mg ÷	mg	116	mg ÷	mg	90
Holbæk . . . . .	mg	ug ÷	134	mg ÷	mg +	126	g	mg	116	mg ÷	mg	88
Sorø . . . . .	mg ÷	ug ÷	136	mg ÷	mg +	126	g	mg	117	g +	mg	90
Præstø . . . . .	mg ÷	ug ÷	136	g +	ug ÷	127	g +	mg +	118	g +	mg	90
Bornholms . . . .	g +	mg +	132	g ÷	mg +	123	g +	mg +	107	g ÷	mg	88
Maribo . . . . .	mg ÷	ug ÷	135	mg ÷	ug ÷	126	g +	mg +	117	mg ÷	mg +	88
Svendborg . . . .	g +	ug ÷	136	mg ÷	ug ÷	126	g	ug ÷	118	g	mg +	90
Odense . . . . .	g +	mg +	134	g +	mg +	125	g +	mg +	117	g	mg	87
Vejle . . . . .	mg ÷	ug ÷	135	mg ÷	mg +	125	g +	mg +	114	mg ÷	mg +	88
Aarhus . . . . .	mg	ug ÷	135	mg ÷	mg +	125	mg ÷	mg +	117	mg ÷	mg +	89
Randers . . . . .	mg ÷	ng ÷	135	mg ÷	mg +	124	mg ÷	mg +	112	mg ÷	mg	89
Aalborg . . . . .	mg	mg	136	mg	mg +	125	mg ÷	mg +	116	mg	mg	86
Hjørring . . . . .	mg ÷	mg +	128	mg	mg +	125	mg	mg +	116	mg ÷	mg	86
Thisted . . . . .	mg ÷	mg +	131	g +	ug ÷	124	g +	mg ÷	112	mg	mg +	87
Viborg . . . . .	mg ÷	mg +	133	mg	mg +	126	g +	mg	117	g +	mg	88
Ringkøbing . . . .	mg ÷	mg +	130	mg ÷	mg	124	g	mg ÷	113	g +	mg ÷	85
Ribe . . . . .	mg	ug	136	mg	mg +	123	mg ÷	mg ÷	109	mg	mg ÷	84
Gennemsnit for hele Landet }	mg ÷	ug ÷	135	mg ÷	mg +	125	g +	mg +	116	mg ÷	mg	88

Amterne	Kartofler		Gulrødder		Runkelroer		Kaalroer		Turnips		Sukkerroer	
	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet
Københavns . .	g	mg ÷	tg +	g	tg +	g +	tg	g	tg +	g	—	—
Frederiksborg .	mg ÷	mg	tg +	g ÷	tg +	mg ÷	tg	mg ÷	tg	g +	—	—
Holbæk . . . . .	g	mg ÷	g	g +	tg +	g +	tg +	g +	tg +	g +	—	—
Sorø . . . . .	mg ÷	mg ÷	g ÷	g	tg	mg ÷	tg +	g	tg	g	—	—
Præstø . . . . .	g	mg ÷	g ÷	g	tg	mg ÷	tg +	g +	tg	g	tg	mg
Bornholms . . . .	g	g	tg	g ÷	tg +	g +	tg ÷	g	tg ÷	g ÷	—	—
Maribo . . . . .	g +	mg	g ÷	g +	g ÷	mg ÷	tg +	g +	tg +	g	mg +	mg +
Svendborg . . . .	mg ÷	mg	tg	g +	tg +	g	tg	g +	tg +	g +	tg +	mg
Odense . . . . .	g +	mg	tg +	mg ÷	tg	mg ÷	tg ÷	g +	tg	g +	tg +	mg
Vejle . . . . .	g ÷	mg ÷	g ÷	g	g ÷	g +	tg	g	tg	g	g ÷	mg ÷
Aarhus . . . . .	g ÷	mg ÷	tg	g	tg +	g +	tg ÷	g +	tg	g	—	—
Randers . . . . .	g	mg ÷	tg +	g +	g ÷	mg ÷	tg ÷	g ÷	tg ÷	g	—	—
Aalborg . . . . .	g +	mg +	g +	g +	g	g +	tg +	g	tg +	g	—	—
Hjørring . . . . .	g +	mg ÷	g +	g +	mg ÷	mg ÷	g ÷	g ÷	tg +	g	—	—
Thisted . . . . .	g	mg ÷	g	g +	g +	mg ÷	tg	g +	tg	g +	—	—
Viborg . . . . .	tg +	g +	g ÷	g	g	mg ÷	tg	g ÷	tg ÷	g ÷	—	—
Ringkøbing . . . .	tg	g +	tg +	g	g ÷	g +	tg ÷	tg +	tg ÷	tg +	—	—
Ribe . . . . .	tg +	g +	tg	g ÷	g ÷	g +	tg +	tg	md +	tg	tg	g
Gennemsnit for hele Landet }	g ÷	mg ÷	tg +	g	tg +	g +	tg ÷	g ÷	tg	g ÷	g ÷	mg

Anm. Ved Kornsorterne er det Kærneudbyttet, hvis Karakter er angivet.

Blandsæd		Bælgsæd		Boghvede	
Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet
g+	mg	g	mg	—	—
g+	mg	g+	mg÷	—	—
mg÷	mg	g	g+	—	—
g+	mg	g	mg÷	—	—
g+	mg	g+	mg	—	—
g	mg	g÷	g+	—	—
g+	mg	g÷	mg+	—	—
g+	mg+	g÷	mg÷	g	g÷
g+	mg	g	mg÷	g	g
mg÷	mg+	g+	mg÷	tg	tg
mg	mg+	g÷	mg÷	g+	g+
mg÷	mg	g	mg÷	tg	g
mg÷	mg	g	mg	g	g
mg÷	mg	mg÷	mg÷	g	—
mg÷	mg÷	g÷	mg	—	—
g+	mg	g÷	g	tg	tg
g+	mg÷	g÷	g+	mdl.	tg÷
mg÷	mg÷	g÷	g+	tg÷	mdl+
mg÷	mg	g÷	mg÷	tg÷	tg÷

er Udtryk for Middelhest. De for Amterne anførte Bedømmelser er Gennemsnitsresultater af Opgivelser, der er indhentede fra større og mindre Jordbrugere, Landboforeninger m. fl. inden for hvert Amts Omraade. De i Tabellen anførte Gennemsnitskarakterer for hele Landet samt de tilsvarende Talangivelser for Kvalitetsvægten er beregnede under Hensyntagen til Størrelsen af det til de forskellige Afgrøder anvendte Areal, saaledes som dette er opgjort for Aaret 1907 (jfr. Statistisk Tabelværk, 5. Række, Ltr. C, Nr. 3). For Sommergræsningens Vedkommende er Hovedkarakteren dog et simpelt Gennemsnit af Amtskaraktererne.

For Landet som Helhed har alle Sædafgrøderne undtagen Bælgsæd og Boghvede givet over Middelhest, hvad Mængdeudbyttet angaar, og endog langt over Middelhest, hvad Kvaliteten angaar.

Bedst var Vintersæden; heraf er Udbyttet af Hveden bedømt sjældent ensartet i samtlige Amter, og det samme gælder, om end i noget mindre Grad, Rugen. En Undtagelse danner dog Bornholm, hvor Udbyttet af Rugen knap naaede Middelhest.

Vaarsædens Mængdeudbytte var for Landet som Helhed over Middelhest. Bygget har givet det mindste Mængdeudbytte, og Høsten af denne Kornsort har paa Øerne, hvor de to Tredjedele af Landets Bygarealer findes, været forholdsvis mindre end i Jylland. Havrens og Blandsædens Mængdeudbytte ligger som Helhed ligesom Vintersædens betydeligt over Middelhest;

Agerhø		Enghe		Sommergræsning
Kvantitet	Kvalitet	Kvantitet	Kvalitet	
g	mg÷	g	mg÷	mdl+
g÷	g	tg+	g+	tg
g	g+	g	g+	tg
g	mg÷	g÷	mg÷	tg÷
g	mg÷	g	mg÷	tg÷
tg+	g+	tg+	mg÷	tg÷
g	mg	g	mg÷	tg+
g	mg÷	g	mg÷	tg+
g÷	g+	g	mg÷	tg
g+	g+	mg÷	mg÷	tg+
mg÷	mg+	mg÷	mg	tg÷
g+	mg÷	g+	mg÷	mdl+
mg÷	mg	g+	mg	tg
mg÷	mg÷	g	mg÷	g÷
mg÷	mg	mg÷	mg÷	tg÷
mg÷	mg	g+	mg	tg
g+	mg÷	g	mg	tg
g+	mg÷	mg÷	mg	tg+
g+	mg÷	g+	mg÷	tg

ogsaa for disse Afgrøder falder Amternes Gennemsnitsresultater meget ensartet, kun paa Bornholm opgives Vaarsædens Udbytte til under Middelhøst.

Bælgsæden har givet noget under Middelhøst i Mængdeudbytte og noget derover i Kvalitet. Høsten af Boghvede var meget lille og af daarlig Beskaffenhed.

For samtlige Sædafgrøder med Undtagelse af Boghveden gælder det, at Kvaliteten overalt ligger over Middel, for Vintersædens og Byggets Vedkommende endog som oftest betydeligt derover, hvilket ogsaa giver sig Udtryk i Kvalitetsvægten, der ligesaa gennemgaaende er over det almindelige.

I Modsætning til Sædhøsten har Høsten af Rodfrugter for Landet som Helhed været under Middelhøst, hvad Mængdeudbyttet angaar. Bedst er Udbyttet af Kartoffler, der staar meget nær ved Middelhøst, hvad Mængde angaar, hvorhos Kvaliteten har været meget god. Runkelroerne har givet et forholdsvis større Udbytte i Jylland end paa Øerne, men da over de tre Fjerdedele af Runkelroearialet findes paa Øerne, bliver Hovedresultatet en Del under Middelhøst; Kvaliteten har i alle Amter været over Middel. Gulerøddernes Mængdeudbytte var betydeligt under det sædvanlige, medens Kvaliteten ret gennemgaaende betegnes som Middelhøst. Sukkerroernes Mængdeudbytte er under Middelhøst, men Afgrøden er af en meget fin Kvalitet. Turnips og Kaalroer har givet det ringeste Udbytte baade med Hensyn til Kvantitet og Kvalitet, men ogsaa for disse Afgrøder gælder det, at Kvaliteten afviger mindre fra det sædvanlige end Kvantiteten.

Høhøsten har for hele Landet under eet været over Middel, og Høets Beskaffenhed har som Helhed været ikke uvæsentlig bedre end normalt; dette gælder baade Ager- og Enghø. Hvad Mængdeudbyttet angaar, opgiver dog enkelte af Øernes Amter — særlig Bornholm — en Del under det sædvanlige.

Sommergræsningen var gennemgaaende tarvelig. Kun i Landets nordligste Del (Hjørring Amt) naar Bedømmelsen op til

g÷, medens den ellers holder sig omkring tg, ja i Københavns og Randers Amter gaar Gennemsnitsbedømmelsen endog ned til mdl+.

---

Paa Grundlag af de i det foregaaende meddelte Oplysninger kan Høsten 1911 for Landet som Helhed karakteriseres saaledes:

Kornafgrødernes Mængde har i 1911 været over Middelhøst og Kvaliteten langt derover. Mest tilfredsstillende var Vintersæden, medens Bygget gav forholdsvis mindst i Mængdeudbytte. — Rodfrugternes Mængdeudbytte var langt under det normale, medens Kvaliteten for Foderroernes Vedkommende skønnes at være som en Middelhøst eller nær derved, og for Kartoffler og Sukkerroer over det normale. — Af Hø høstedes der noget mere end sædvanligt, og Kvaliteten var tilfredsstillende, hvorimod Sommergræsningen som Helhed var tarvelig.

---